

SERVICE	ESSAI	PROMOTEUR	RECHERCHE
ONCOLOGIE-PNEUMOLOGIE	ONCOBIOTICS	IGR	Découverte de biomarqueurs spécifiques du microbiote par métagénomique chez les personnes atteintes de cancer "B2MC / ONCOBIOTICS STUDY"
	ORBITAL	IFCT	Etude multicentrique phase II évaluant l'efficacité et la sécurité de l'osimertinib chez les patients atteint d'un cancer bronchique non à petites cellules muté EGFR présentant des métastases cérébrales ou leptoméningées
	DENIVOS	CHU D'ANNECY	Essai de phase II, monobras, évaluant en seconde ligne des CBNPC (épidermoïdes et non épidermoïdes) de stade IV avec métastases osseuses, l'association denosumab + nivolumab.
	IFCT-1805 ELDERLY	IFCT	Etude de phase III randomisée, étudiant l'atezolizumab chez des patients âgés présentant un Cancer du Poumon Non à Petites Cellules de stade avancé et recevant une chimiothérapie par carboplatine mensuel et paclitaxel hebdomadaire
	PRAISE	HUS	e-cohorte patients sur les effets immunologiques secondaires à l'immunothérapie dans le cancer
	PRM	ROCHE	Personalized Reimbursement Models
	TERAVOLT	GFPC	Registre international des patients atteints de COVID-19 et d'un cancer bronchique
	PIONEER	APHM	Immuno-oncologie de précision pour les patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules (CPNPC) traités par anti PD (L) 1
	ALK EXPLORE	GFPC	Etude de cohorte non-interventionnelle, nationale et multicentrique de patients atteints de cancer bronchopulmonaire non-à-petites cellules caractérisés par un réarrangement ALK : évaluation des caractéristiques cliniques et moléculaires des CBNPC ALK réarrangés, de l'efficacité et de la tolérance des traitements, et de la gestion de la progression tumorale.
	LIST	BMS	Etude non-interventionnelle multi-cohorte, multicentrique, longitudinale, prospective chez des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules avancé, traités par nivolumab, en France, après au moins un traitement antérieur incluant une chimiothérapie
	PERSEE	CHU BREST	Essai randomisé, ouvert et contrôlé de phase III, comparant l'association pembrolizumab-chimiothérapie à base de sels de platine au pembrolizumab en monothérapie, en première ligne de traitement de cancers broncho-pulmonaires non à petites cellules (CBPNC) caractérisés par une expression de PD-L1 sur plus de 50% des cellules tumorales
OBSTINATE	GFPC	Etude prospective observationnelle, nationale et multicentrique, de qualité de vie chez des patients atteints de cancer bronchopulmonaire non à petites cellules de stade III non résecable	
PNEUMOLOGIE	VENTIOBS	VIVISOL	Étude de l'observance de la VNI à domicile chez des patients atteints de BPCO au décours de l'introduction d'une VNI au long cours
	INHASCO	APHP	Rôle protecteur des stéroïdes inhalés contre l'infection Covid-19
	Second souffle	CRISALIS	Enquête sur le parcours de soins et la qualité de vie des patients souffrant d'asthme sévère
	OrphaLung	HCL	Déclaration des cas de COVID-19 avec une maladie pulmonaire rare et/ou PID
	AB20001	AB SCIENCE	Etude clinique de phase 2, randomisée, double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant la tolérance et l'efficacité du Masitinib combiné avec de l'Isoquercétine et des soins de soutien optimaux chez les patients hospitalisés atteints de formes modérées et sévères de COVID-19
	PROGRESSION	HCL	Prise en charge pragmatique de la fibrose pulmonaire idiopathique en progression : essai randomisé

SERVICE	ESSAI	PROMOTEUR	RECHERCHE
ONCOLOGIE - HEMATOLOGIE	GRALL 2014	GRAALL	Protocole multicentrique de traitement des Leucémies Aiguës Lymphoblastiques (LAL) de l'adulte jeune (18-59 ans)
	ANRS CO24 OncoVIHAC	ARC	Cohorte type observatoire multicentrique de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ayant un cancer traité par des anticorps inhibiteurs des checkpoints immunitaires
	PREDOMOS	AP-HM	PRÉcaritéchez le sujet âgé atteint de cancer : Impact sur la qualité de vie d'une approche DOMOtiqueet par téléassistance pour les patients âgés pris en charge pour un cancer métastatique ou localement avancé et isolés Socialement : Etude multicentrique, prospective, comparative, randomisée
	APOLLO	Technische Universität Dresden (TUD)	Etude randomisée de phase III visant à comparer le trioxyde d'arsenic (ATO) combiné à de l'ATRA et de l'Idarubicine contre un traitement standard de l'ATRA et de la polychimiothérapie à base d'antracyclines (schéma AIDA) chez les patients avec une leucémie aiguë promyélocytaire de haut risque nouvellement diagnostiquée – Etude APOLLO
	EMMY	IFM	Epidémiologie de la prise en charge thérapeutique du myélome multiple en France
	RUMYCUP	NOVARTIS	Ruxolitinib chez des patients atteints de myélofibrose en France : étude observationnelle prospective
	CONFIRM	APHP	Etude multicentrique randomisée de phase III comparant un traitement continu versus une durée fixe avec le Daratumumab, Lenalidomide et Dexaméthasone dans le myélome multiple en rechute
	EWALL PH-03	CH de Versailles	Etude de phase II randomisée à 3 bras en ouvert, comparant la sécurité et l'efficacité du Ponatinib soit en combinaison avec la chimiothérapie ou en combinaison avec le Blinatumomab et de l'Imatinib en combinaison avec la chimiothérapie chez les patients âgés de 55 ans et plus atteints de leucémie aiguë lymphoblastique associée au chromosome de Philadelphie (Ph+) ou BCR-ABL positives
HEMATOLOGIE	PRIMO	ANRS	Cohorte primo-infection
	TRANS&VIH	ANRS	Enquête nationale sur les parcours et les conditions de vie des personnes trans séropositives en France
	RHIVIERA-01	ANRS	Evaluation de la probabilité de contrôle de l'infection par le VIH lors d'une interruption de traitement antirétroviral chez des sujets de la cohorte ANRS CO6 PRIMO traités précocement et qui portent le génotype CMH B35 (B53) Bw4TTC2
ONCOLOGIE-GASTRO-ENTEROLOGIE	PRODIGE 34 - ADAGE	FFCD	Etude de phase III randomisée, évaluant la chimiothérapie adjuvante après résection d'un adénocarcinome colique de stade III chez les patients de 70 ans et plus
	PRODIGE 25 - FOLFA	FFCD	Etude de phase II randomisée, évaluant l'AFLIBERCEPT associé au schéma LV5FU2 en première ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques non résécables
	PRODIGE 54 - SAMCO	FFCD	Etude de phase II multicentrique randomisée comparant l'efficacité et la tolérance de l'avelumab versus un traitement standard en 2ème ligne chez les patients avec cancer colorectal métastatique et instabilité microsatellitaire (MSI)
	PRODIGE 62 - OESIRI	FFCD	Nal-IRI/LV5FU versus paclitaxel en 2ème ligne de traitement chez les patients atteints de carcinome épidermoïde de l'œsophage métastatique
	PRODIGE 29 - NEOPAN	UNICANCER	Essai randomisé de phase III comparant une chimiothérapie selon le protocole Folfirinox à la gemcitabine pour le traitement du carcinome localement avancé du pancréas.
GASTRO-ENTEROLOGIE	RADICO	INSERM	Cohorte nationale sur l'épidémiologie, l'hétérogénéité clinique et génétique du syndrome "Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis" (LPAC)
	REALITY	Alfasigma	Etude observationnelle évaluant la sécurité de la rifaximine-α dans la prise en charge d'une encéphalopathie hépatique
	Lilly I6T-MC-AMAM	Lilly	Étude de Phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo et comparateur actif et en traitement continu visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du mirikizumab chez les patients atteints d'une maladie de Crohn active modérée à sévère
ONCOLOGIE -ORL	NIVO POST-OP	GORTEC	Essai de phase III randomisé évaluant l'ajout de nivolumab à l'association cisplatineradiothérapie (traitement standard) dans le cancer épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN) localement avancé opéré, à risque élevé de récurrence
ONCOLOGIE-UROLOGIE	TALISMAN	IPSEN Pharma	Traitement du cancer agressif de la prostate dans la vie réelle : instauration, posologie et prise en charge du traitement par le triptoréline

SERVICE	ESSAI	PROMOTEUR	RECHERCHE
ONCOLOGIE - GYNECOLOGIE	UNIRAD	UNICANCER	Essai de phase 3 randomisé, en double aveugle, évaluant la tolérance et l'efficacité de l'ajout de l'évérolimus associé à une hormonothérapie adjuvante, chez des patientes ayant un cancer du sein RE+/HER2-, de mauvais pronostic et sans rechute après trois ans d'hormonothérapie adjuvante.
	SERC	IPC	Essai de phase 3 randomisé, évaluant la non-infériorité de la réalisation ou non d'un curage axillaire en cas d'envahissement des ganglions sentinelles, chez des patientes ayant un cancer du sein invasif.
	GREAT	GINECO	Etude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patients atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d'une mutation BRCA ou d'anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA
GYNECOLOGIE	INSTRUMODA	CHU de Poitiers	Impact de l'épisiotomie médiolatérale pour la prévention des lésions obstétricales du sphincter anal au cours de l'accouchement instrumental : une large étude observationnelle nationale
MEDECINE INTERNE - RHUMATOLOGIE	LUMIER <sup>2</sup>	APHM	Evaluation de biomarqueurs prédictifs de poussée de Lupus Erythémateux systémique
	ART	SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE	Registre national français sur les arthrites rhumatoïdes et anti-TNF
	BAMBOO SPINE	APHP	Cohorte sur la Spondylarthrite ankylosante avec syndesmophytes
	PROUST	JANSSEN	Etude prospective, multicentrique, non interventionnelle, pour caractériser le PROfil des patients atteints de rhumatisme psoriasique et initiant un traitement par USTekinumab, selon s'ils sont pris en charge par un dermatologue ou par un rhumatologue
	EGR2	APHP	Etude prospective observationnelle sur la grossesse au cours des maladies rares
REANIMATION	TIPEX VOLTEX	CHIAP	Effet de la Titration de la Pression Expiratoire positive sur le VOLume télé-Expiratoire mesuré par la technique de dilution à l'azote au cours du Syndrôme de Détresse Respiratoire Aiguë
	ECOLI CONTACT	CHIAP	Impact de l'arrêt de l'isolement des patients porteurs d'E.Coli BLSE en réanimation, étude avant-après
	COVADIS	ERASME-Bruxelles	Cohorte internationale de patients infectés par SARS-Cov-2
	COVIDANCE	APHM	Intérêt du traitement par losartan et de la spironolactone dans la régulation du système rénine-angiotensine dans le pronostic des patients infectés par le COVID-19 et atteints d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë
DIABETOLOGIE	DEEP	ISIS	Impact sur l'équilibre glycémique à 12 mois d'un suivi intensif après instauration d'une pompe à insuline chez des enfants diabétiques de type 1
	MYO-GDM	APHP	Réduction de l'insulino-requérance sous myo-inositol dans le diabète gestationnel : une étude multicentrique prospective randomisée contrôlée versus placebo
PEDIATRIE / NEONAT	NEOSTEM	APHM	Encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale : étude de la tolérance et de la faisabilité d'un traitement curatif par les cellules souches du sang du cordon ombilical
DERMATOLOGIE	VALUE	Abbvie	Etude observationnelle prospective, internationale chez les patients atteints de psoriasis en plaques chroniques modéré à sévère
SOINS PALLIATIFS	PREVAL	SFAP	Prévalence des sédations profondes en phase palliative terminale

SERVICE	ESSAI	PROMOTEUR	RECHERCHE
CARDIOLOGIE	DAI-PP	SFC	Observatoire Multicentrique Français des Porteurs de Défibrillateur Automatique Implantable
	ENCOCHE SFC	SFC	ENquête prospective, multicentrique évaluant la prise en Charge des Occlusions coronaires CHroniques En France
	MYOCOVID	SFC	Registre hospitalier de myocardites aiguës : Évolution de la proportion de cas SARS-Cov-2 positifs pendant la pandémie de Covid19, caractéristiques et pronostic des cas
	OFICA 2	SFC	OBSERVATOIRE FRANÇAIS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUË
	OSIRIS	SORIN	Etude observationnelle des thérapies inappropriées après le remplacement des défibrillateurs automatiques implantables
	TROUPER	CH NORD	Clopidogrel ou ticagrelor pour les patients insuffisants rénaux chroniques modérés sévères ou terminaux traités par angioplastie coronaire dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu
	ISARNEO	BRAUN	Suivi Clinique Post-Commercialisation de Coroflex® ISAR Neo
	STER AF	ESC	Stroke prevention and rhythm control Therapy: Evaluation of an Educational Programme of the European society of cardiology in a cluster-Randomised trial in patients with Atrial Fibrillation
	STEMI COVID	CNCH	Evolution du nombre de patients hospitalisés pour syndrome coronarien aigu durant la pandémie de COVID-19 : un aperçu de la situation en France
	SICD SURVEY	CNCH	Evaluer rétrospectivement l'expérience française concernant le défibrillateur sous-cutané
	CHLOVIS	CH ST ETIENNE	Comparaison entre la Chlorhexidine Alcoolique à 2% versus la Povidone Iodée Alcoolique dans la Prévention des Infections de Dispositifs Implantables Resynchronisateurs
	CICD	ESC	Chronic Ischemic Cardiovascular Disease
EARLY	PHRC	Revascularisation immédiate ou retardée pour les syndromes pour les syndromes coronariens aigus sans sus décalage persistant du segment du segment ST à risque intermédiaire ou élevé ?	
OPHTALMOLOGIE	IN SIGHT	IRIS PHARMA	Efficacy and safety assessment of T4032 (unpreserved bimatoprost 0,01%) versus Lumigan 0,01% in ocular hypertensive or glaucomatous patients
NEUROLOGIE	TEC ADHERE	BIOGEN	Etude non interventionnelle sur la persistance au diméthyl fumarate (DMF, Tecfidera®) chez des patients atteints de sclérose en plaques rémittente récurrente (RR-MS) et bénéficiant d'un soutien dans le cadre du programme d'accompagnement OroSEP